
Psykiatrisk samsjuklighet

— Markus Takanen —
Specialist BCS



Agenda

- Psykiatrisk samsjuklighet
- Stigmatisering
- Trösklar i vården

Funktion

- Varför är det viktigt
- Roll i diagnostik
- ICF

Vanligaste diagnoserna

- Ångesttillstånd
- Affektiva syndrom
- Personlighetssyndrom
- Andra substansberoenden

Samsjuklighet

75-85 % har en psykiatrisk samsjuklighet

45-65 % har en personlighetssyndrom

35 % ADHD i barndomen

25 % ADHD i vuxen ålder

Utredning

- Basutredning
- Fördjupad utredning
- Timing

ADHD Vad är det?

- Tre typer (tidigare ADD mfl)
- Symtom
- Hur vanligt

ADHD Behandling

- Centralstimulerande eller inte
- AT, Psykologisk behandling
- Beroendeframkallande? Vilken effekt söker vi?

Personlighetssyndrom Vad är det?

- Hur mäts en personlighet?
- Vanligast
- Vad leder det till?

Behandling

- Emotionellt instabil
- Antisocial
- Vad är poängen?

Affektiv sjukdom

Depression, bipolär sjukdom

Behandling

PTSD

- Trauma
- Utredning
- Behandling

Ångestsjukdomar

- Paniksyndrom
- GAD
- Fobier mm


Alkoholberoende

- Varför kan inte jag dricka som andra?
- Hepatit + Alkohol
- Behandling

Bensodiazepinberoende

- Vanligt
- Farligt
- Finns det en plats?

Sömn



Sömn och sömnstörningar

Upp till 70% av metadonpatienterna

Både bibehållande och insomning

Svårbehandlat


Sömn Behandling

- Läkemedel
- Psykologisk
- Vanebildande?

I huvudet på en psykiater

- Vetenskaplighet
- Garantier
- Patientens rätt

Hjärtats elsystem



Hjärtsjukdomar

QT förlängningar

Infektioner

Hjärttoxiskt

Testosteron och sex


Testosteronbrist

Nedsatt lust och förmåga

Stigmatisering

- “Diabetes kontra opiodberoende”
- Brukarnas roll
- Sbr

PLEASE RE-SUBMIT



FORM 117B #3 PART 2

Trösklar

- “Liftarens guide till beroendevården”
- Olika delar olika problem
- Funktionsnivå

Frågor och sammanfattning